

COPRIDES NOUVEAUX

de la région orientale et remarques synonymiques

par **Joseph-J.-E. Gillet** (Nivelles)

SYNAPSIS YAMA nov. sp.

Espèce voisine de *S. birmanicus* GILLET, Ann. Mus. Civ. Genova (3), III, 1907, p. 600, décrite de Haute-Birmanie.

Tête proportionnellement plus large, à ponctuation moins dense et un tant soit peu plus fine, angles postérieurs des joues encore plus droits, mais à sommet plus arrondi.

Prothorax plus carré; angles postérieurs plus distincts, subparallèles, à bords latéraux un peu dilatés avant les angles antérieurs, qui sont coupés obliquement mais non sinués au bord externe; la

*Synapsis birmanicus* GILLET*Synapsis Yama* GILLET

ponctuation est très distincte sur les côtés et le long du bord postérieur, mais ne se change pas en granules le long de la marge.

Les stries des élytres sont encore plus superficielles que dans l'espèce précitée, et les points dont elles sont ornées sont à peine apparents.

Les fossettes pubescentes du prothorax sont disposées de la même manière et offrent la même conformation; le tubercule dentiforme des cuisses postérieures est un peu plus éloigné des trochanters.

Dans les deux espèces, l'épine terminale des tibias antérieurs est acuminée et légèrement courbée en dehors.

Long. : 28 mill.

Hab. : Tonkin central, environs de Tuyen-Quan (Museum de Paris, A. WEISS, 1906); un exemplaire ♂.

ONITIS SIVA nov. sp.

Espèce dont je ne connais que la ♀, étrangement semblable à celle de *O. robustus* BOH., mais présentant, entre autres, les caractères différentiels qui suivent.

Elytres plus allongés, striés et ponctués de la même façon : les épaules assez proéminentes. Métastrernum, dans sa moitié postérieure seulement, orné d'une carène longitudinale peu prononcée.

Long. : 23 à 31 mill.

Hab. : Indes orientales : Travancore (Wallardi, R. P. FAVRE); deux exemplaires ♀♀ dans ma collection.

La ressemblance qui existe entre les ♀♀ de *O. robustus* et de *O. Siva* fera immédiatement reconnaître cette dernière; c'est ce qui m'a décidé à la faire connaître bien que jusqu'à présent je n'aie pu en examiner le mâle.

Quelques synonymies

1. **Gymnopleurus cyaneus** FAB., Ent. Syst. Suppl., 1798, p. 34 = *G. indicus* CAST., Hist. Nat. Col., II, 1840, p. 73.

2. **Copris fricator** FAB., Mant. Insect., I, 1787, p. 15 = *C. indicus* GILLET, Notes Leyden Mus., XXXII, 1910, p. 5.

3. **Copris acutidens** MOTSCH., Etud. entom., 1860, p. 13 = *C. *glabriceps* FELSCHÉ, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1910, p. 346; l'exemplaire décrit par M. FELSCHÉ est une femelle provenant de Chine centrale (province de Hou-Pé).

4. **Copris *sinicus** HOPE. J'ai examiné, au British Museum, le type (♂) de cette espèce, et je crois bien ne pouvoir la séparer de *C. sulvicollis* LANSB., Tijdschr. v. Entom., XXIX, 1886, p. 10. Cette espèce semble avoir une aire de distribution très étendue; on la trouve en Chine, en Indo-Chine, dans la presqu'île Malaise et à Java.
